

## MEDEL

Taimekaitsevahend  
Molluskitsiid

Taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.

**Toimeaine:** metaldehüüd 50 g/kg

**Preparatiivne vorm:** granuleeritud sööt

**Eesti reg. nr.:** 0589/21.01.16

**Pakend:** 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.

**Loa haldaja:** Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgia

**Tootja/pakkija:** Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra (West) Mumbai- 400 050, India

**Esindaja/Edasimüüja:** Baltic Agro AS, Peterburi tee 44, 11415 Tallinn, Estonia

**Valmistamise kuupäev ja partii No:** vt pakendilt

**Toode sisaldab ohtlikke aineid metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid!**

**Tigude graanulite pakendeid suurusega üle 1kg tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!**

**Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!**

**Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 16662.**

**Hädaabitelefon: 112**

### HOIATUSLAUSED

**P101** Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

**P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**P235+P410** Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

### TÄIENDAVALD MÄRGISTUSE ELEMENDID

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

**SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**SPe6** Lindude/looduslike imetajate kaitsmiseks kõrvaldada lekkinud vahend.

**SPr1** Sööt tuleb ohutult ladustada, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu.

### ESMAABI

Enesetunde halvenemisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või selle etiketti. Õnnetuse korral helistada HÄDAABI TELEFONILE 112.

**Allaneelamisel:** Loputada suud veega. Viivitamatult helistada Mürgistusteabekeskusesse või arstile. **Sissehingamisel:** Viia kannatanu värske õhu kätte, hingamise katkemisel teha kunstlikku hingamist. Kutsuda arst. **Kokkupuutel nahaga:** Eemaldada saastunud rõivad. Pesta saastunud ala rohke veega. **Kokkupuutel silmadega:** Eemaldada koheselt kontaktläätsed (kui neid kantakse) ning loputada rohke veega 20 minutit. Kontakteeruda koheselt arstiga (võimalusel näidata etiketti).

## OHUTUSMEETMED JA HEA PÖLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED

Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m pinnaveekogudest.

Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode.

### Hoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal!

Preparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida.

- o Kalibreerige külvik enne kasutamist
- o Täitke ja puhastage külvik põllul
- o Ärge täitke ja puhastage aias

## KASUTUSJUHEND

**MEDEL** on preparaat tigu ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.

Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigu ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigu ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.

**MITTE KASUTADA** enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtkõögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

### Kasutamine

Kulunorm: 7 kg/ha

Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist.

Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigu tõrjel graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Targanud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel.

Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi panna mullale.

**Maksimaalne kasutuskordade arv:** 2 korda hooajal (maksimum 14kg/ha), minimaalne intervall 7-10 päeva.

TAIM	PREPARAADI KASUTAMINE
Teraviljad	Kasutada külvist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 29)
Salat	Kasutada külvist kuni faasini, mil 10% sordile omasest lehemassist on saavutatud (BBCH 41)
Tali- ja suviraps	Kasutada külvist kuni kõrvalvõrsete arengu lõpuni (BBCH 29)
Kartul	Kasutada mugulate mahapanekust kuni pealsete hävimiseni (BBCH97)
Marjapõõsad	Kasutada kuni õitsemise lõpuni (BBCH 69)

<b>Mais</b>	Kasutada külvist kuni 5. lehe lahtikeerdumiseni (BBCH 15)
<b>Ilutaimed</b>	Kasutada külvist kuni seemnete valmimiseni (BBCH 99)
<b>Karjamaad ja murud</b>	Karjamaad: kasutada külvist kuni BBCH 15 Murud: kasutada külvist kuni kasvuhooaja lõpuni
<b>Viljapuud: õun ja pirn</b>	Kasutada kuni õielehtede lõpliku varisemiseni (BBCH 69)

**Jäätmete ja pakendi kahjutustamine** Toote jäägid, lekkinud toode ning ka toote tühjad pakendid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Pakendite korduvkasutamine on keelatud.

**Säilitamine** Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud ja valguse eest kaitstud kohas, hermeetiliselt suletud originaalpakendis. Vältides temperatuure alla 0°C ja üle 30°C. Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.